Instrucciones de uso
XARELTO®
(zah-REL-toe)
(rivaroxaban)
para suspensión oral



Estas Instrucciones de uso contienen información sobre cómo administrar una dosis de XARELTO suspensión oral.

Lea estas Instrucciones de uso antes de administrar XARELTO y cada vez que reciba un resurtido del medicamento. Es posible que este material contenga información nueva.
El presente folleto no reemplaza la conversación con el médico acerca de la enfermedad o el tratamiento de su hijo.

Información importante:

- La suspensión de XARELTO es solo para uso oral.
- Administre XARELTO a su hijo exactamente como se lo recetó el médico. El cuidador adulto debe administrar la dosis. Si tiene preguntas, comuníquese con su médico o farmacéutico para obtener más información sobre cómo administrar una dosis.
- **Utilice únicamente la jeringa dosificadora oral que se proporciona con XARELTO suspensión oral.** Comuníquese con su médico o farmacéutico si la jeringa dosificadora oral falta, se pierde o está dañada.

Información sobre almacenamiento

Almacene XARELTO suspensión oral a temperatura ambiente entre **20 ºC y 25 ºC** (68 ºF y 77 ºF).

No congelar.

Conserve el frasco en posición vertical con las jeringas de dosificación oral incluidas en la caja original.

Mantenga XARELTO y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Jeringa de dosificación oral de XARELTO:

Lado 1: Dosis en mililitros (ml) **Lado 2: Dosis con banda de color* (ml)**



* La banda de color sirve de ayuda para retirar la dosis prescrita.

Frasco de XARELTO

Paso 1 Prepárese



Verifique la fecha de "Desechar después de" en el frasco de XARELTO.
Si ha pasado la fecha de "Desechar después de", **no** lo use y llame a su médico o farmacéutico.

Lávese las manos.
Lávese bien las manos con agua tibia y jabón.

Paso 2 Prepare XARELTO

Agite el frasco lentamente durante 10 segundos antes de cada uso.

No agite el frasco demasiado rápido para evitar la formación de espuma. La formación de espuma puede hacer que se administre la dosis incorrecta.



Revise la suspensión oral de XARELTO.

Si hay grumos o gránulos en el fondo del frasco, agítelo **lentamente** otra vez durante **10 segundos**.

Paso 3 Verifique la dosis prescrita

Encuentre su línea de dosis.
Puede usar cualquiera de los lados de la jeringa para establecer su dosis.

Si usa el lado de ml de la jeringa:
la parte superior del émbolo debe alinearse con los ml recetados.

Si usa el lado de color de la jeringa:
la parte superior del émbolo debe alinearse con la línea de ml recetados en la **parte inferior de la banda de color.**

Utilice únicamente la jeringa dosificadora oral que se proporciona con XARELTO suspensión oral.



Si su dosis es superior a 5 ml.

Deberá utilizar la misma jeringa más de una vez. Repita los pasos 4 y 5 para completar su dosis. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Dosis	Medida
7.5 ml	5 ml + 2.5 ml
10 ml	5 ml + 5 ml
15 ml	5 ml + 5 ml + 5 ml
20 ml	5 ml + 5 ml + 5 ml + 5 ml

Paso 4 Establezca la dosis prescrita



Empuje el émbolo hasta el fondo para eliminar el aire.

Inserte la jeringa dosificadora oral en el adaptador del frasco.

Gire la tapa del frasco.

No retire el adaptador del frasco.

Inserte la punta de la jeringa en el adaptador del frasco.



Llene la jeringa de dosificación oral.

Ponga el frasco boca abajo como se muestra.

Tire del émbolo para llenar la jeringa de dosificación oral **un poco más allá de la línea de dosis prescrita** para eliminar las burbujas de aire.

⚠ ATENCIÓN:

Asegúrese de tener suficiente medicamento para una dosis completa. No tome una dosis parcial.



Golpee suavemente la jeringa para que las burbujas de aire se muevan hacia la parte superior.

Esto ayuda a establecer la dosis correcta.



Ajuste a su dosis recetada.

Si usa el lado de ml de la jeringa: Empuje el émbolo para alinearlo con la línea de dosis prescrita.

Si usa el lado de color de la jeringa: Empuje el émbolo para alinearlo con la línea de ml recetados en la **parte inferior de la banda de color.**



Retire la jeringa de dosificación oral.

Coloque el frasco sobre una superficie plana.
Retire la jeringa de dosificación oral del frasco.

Paso 5 Administre la dosis

Administre la dosis.

Coloque con cuidado la jeringa dosificadora oral en la boca del niño con **la punta de la jeringa apuntando hacia la mejilla y presione lentamente el émbolo**.
Esto permite que el niño trague de forma natural.
Asegúrese de que el niño ingiera la dosis completa.
Si su hijo vomita o escupe el medicamento repetidamente, comuníquese con el médico de su hijo de inmediato.

Si su dosis es **superior a 5 ml**, deberá utilizar la misma jeringa más de una vez.
Repita los pasos 4 y 5 para completar su dosis.

Paso 6 Enjuague y almacene



Cierre el frasco de XARELTO y enjuague la jeringa dosificadora oral.

Enjuague la jeringa dosificadora oral con agua del grifo y déjela secar al aire.

No coloque la jeringa dosificadora oral en el lavavajillas.

Cómo desechar el frasco y la jeringa de XARELTO

- Tire la botella de XARELTO a la basura de su casa.
- Deseche todas las jeringas dosificadoras orales usadas al abrir un nuevo frasco de XARELTO.
- **No vierta la suspensión XARELTO por el desagüe** (por ejemplo: el lavabo, el inodoro, la ducha o la bañera).
- **No** recicle el frasco.

Fabricado para:
Janssen Pharmaceuticals, Inc.
Titusville, NJ 08560, USA
Con licencia de:
Bayer HealthCare AG
51368 Leverkusen, Alemania

Para obtener información sobre patentes, ingrese a www.janssenpatents.com

© Johnson & Johnson and its affiliates 2021, 2024

Xarelto es una marca registrada de Bayer Aktiengesellschaft.

Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (U.S. Food and Drug Administration, FDA).

Publicado: 11/2024

cp-291238v3