

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

UPTRAVI® (up-TRA-vee)
(selexipag)
comprimidos

UPTRAVI® (up-TRA-vee)
(selexipag)
inyectable

¿Qué es UPTRAVI?

- UPTRAVI es un medicamento recetado que se usa para tratar la hipertensión arterial pulmonar (HAP), que es la presión arterial alta en las arterias de los pulmones.
 - UPTRAVI puede ayudar a retrasar el progreso de su enfermedad y reducir su riesgo de ser hospitalizado por HAP.
- Se desconoce si UPTRAVI es seguro y eficaz para niños.

No tome UPTRAVI si:

- toma gemfibrozil, debido a que este medicamento puede afectar el funcionamiento de UPTRAVI y causar efectos secundarios.
- es alérgico al selexipag o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (enumerados en Ingredientes inactivos).

Antes de administrarse UPTRAVI, informe al proveedor de atención médica sobre todas las demás enfermedades que padezca, incluso si:

- tiene problemas hepáticos.
- tiene un estrechamiento de las venas pulmonares, una afección llamada enfermedad venooclusiva pulmonar.
- está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si UPTRAVI puede dañar al feto.
- está amamantando o tiene previsto hacerlo. Se desconoce si UPTRAVI pasa a la leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deberán decidir si tomará UPTRAVI o amamantará. No debe hacer ambas cosas.

Informe al proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos naturales. UPTRAVI y otros medicamentos pueden interferir entre sí y provocar efectos secundarios. No comience a tomar ningún medicamento nuevo hasta que consulte con su proveedor de atención médica.

¿Cómo debo tomar UPTRAVI?

UPTRAVI comprimidos

- Tome UPTRAVI exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica. No deje de tomar UPTRAVI a menos que su proveedor de atención médica se lo indique.
- Su proveedor de atención médica aumentará lentamente su dosis hasta encontrar la dosis de UPTRAVI adecuada para usted.
- Si tiene efectos secundarios, su proveedor de atención médica puede indicarle que cambie su dosis de UPTRAVI.
- UPTRAVI se puede tomar con o sin alimentos. Tomar UPTRAVI con alimentos puede ayudarle a tolerarlo mejor.
- Por lo general, UPTRAVI se toma 2 veces al día.
- Trague los comprimidos enteros. No divida, triture ni mastique los comprimidos.
- Si olvida una dosis, tómela no bien se acuerde. Si su próxima dosis programada está dentro de las siguientes 6 horas, omita la dosis olvidada. Tome la siguiente dosis en el horario habitual.
- Si olvida tomar UPTRAVI 3 días o más, llame a su proveedor de atención médica para ver si es necesario cambiar su dosis.
- Si toma demasiado UPTRAVI, llame a su proveedor de atención médica o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano.

UPTRAVI administrado por inyección intravenosa (IV)

- Su proveedor de atención médica le administrará UPTRAVI en una vena a través de una vía intravenosa (IV).
- Su proveedor de atención médica decidirá la cantidad de UPTRAVI inyectable que recibirá cada día, en función de su dosis actual de UPTRAVI comprimidos.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

Entre los efectos secundarios más frecuentes de UPTRAVI se incluyen los siguientes:

- | | |
|-------------------------------|---|
| • dolor de cabeza | • náuseas |
| • dolor mandibular | • vómitos |
| • dolor muscular | • rubefacción |
| • dolor en brazos o piernas | • recuento bajo de glóbulos rojos |
| • dolor en las articulaciones | • sarpullido |
| • falta de apetito | • dolor, enrojecimiento o inflamación en el lugar de la inyección de UPTRAVI inyectable |
| • diarrea | |

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de UPTRAVI.

Llame a su médico para consultar sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios llamando a la FDA al 1-800-FDA-1088

¿Cómo debo conservar UPTRAVI comprimidos?

Almacene los comprimidos de UPTRAVI a temperatura ambiente entre 20 °C y 25 °C (68 °F y 77 °F).

Mantenga UPTRAVI y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general acerca del uso seguro y efectivo de UPTRAVI.

En ocasiones, los medicamentos se recetan para otros propósitos que no figuran en la lista del folleto de Información para el paciente.

No utilice UPTRAVI para tratar una afección para la que no fue recetado. No ofrezca UPTRAVI a otras personas, aunque presenten los mismos síntomas que usted. Este medicamento puede hacerles daño. Puede solicitar información destinada a profesionales de la salud acerca de UPTRAVI a su proveedor de atención médica o a su farmacéutico.

¿Cuáles son los ingredientes de UPTRAVI?

UPTRAVI comprimidos

Ingrediente activo: selexipag

Ingredientes inactivos: almidón de maíz, D-manitol, hidroxipropilcelulosa, hidroxipropilcelulosa de baja sustitución y estearato de magnesio. Los comprimidos están recubiertos con una película con un material de recubrimiento que contiene cera de carnauba, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, junto con mezclas de óxido de hierro negro, óxido de hierro rojo u óxido de hierro amarillo.

UPTRAVI inyectable

Ingrediente activo: selexipag

Ingredientes inactivos: glicina, ácido fosfórico, polisorbato 20 e hidróxido de sodio.

Fabricado para:

Actelion Pharmaceuticals US, Inc.
una compañía de Janssen Pharmaceutical Company
South San Francisco, CA 94080, USA
Fabricado en el Reino Unido

JNJ20211022

© 2015–2021 Actelion Pharmaceuticals US, Inc.

Para obtener más información, llame a Janssen al 1-800-526-7736 (1-800-JANSSEN) o visite www.UPTRAVI.com.

La Información para el paciente fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos.

Revisado: 10/2021